



歡迎訂閱
電子報

藥物食品

安全週報 第743期

1 感冒藥配咖啡？ 小心越睡越累

感冒是一種上呼吸道感染的疾病，大多是病毒所引起，症狀有發燒、鼻塞、流鼻水、頭痛、喉嚨痛等，坊間傳聞「吃感冒藥配咖啡好得快」？對此，臺北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師陳又任說明，一旦感冒時，疾病發展到一定程度後就會逐漸恢復，只需支持性療法及症狀治療即可，如果吃感冒藥又配咖啡喝，一旦產生交互作用，可能會讓身體更不舒服喔。

常見的感冒藥成分有4大類

(1)解熱鎮痛劑

如：Acetaminophen (乙醯胺酚) 具有解熱鎮痛的效果，大劑量服用或與酒精併用可能會損害肝臟，應遵照醫囑或藥品仿單(說明書)使用，且服藥期間應避免飲用酒精性飲料。

(2)抗組織胺劑

常用於打噴嚏流鼻水，如：第一代抗組織胺Chlorpheniramine，常見副作

用如：嗜睡、口乾等，因此服用後不要開車、騎車，操作危險器械或從事警覺性的工作。

(3)解鼻充血劑

如：麻黃素類藥物 (Phenylephrine、Pseudoephedrine) 用於鼻塞，通常是短期使用，長期使用停藥後，可能會引起反彈性鼻塞，過量時還可能會使血壓升高、心悸、失眠等副作用出現。

(4)止咳祛痰劑

止咳劑如：Dextromethorphan、Noscapine等，祛痰劑如 Terpin Hydrate 可增加支氣管的分泌，將濃痰稀釋，刺激排痰。



至於咖啡具有提神醒腦、緩解頭痛症狀，但如果喝太多，可能會導致胃食道逆流等，不同體質可能出現心悸、影響睡眠的情形。此外，咖啡也會與某些

藥物形成交互作用，如：與鎮靜安眠藥同時使用會降低藥效，因此不宜與藥品同時併服，為了健康起見，依據食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）建議，含有咖啡因成分的包裝飲料，咖啡因的每日攝取量不宜超過300mg。

有些綜合感冒藥含有咖啡因成分，藉由收縮腦血管，加強Acetaminophen的止痛效果，藉此治療頭痛。但如果吃感冒藥又喝咖啡時，萬一感冒藥中有麻黃素類藥品，會與咖啡產生交互作用，反而更容易造成心悸、失眠等情形，大劑量服用或與酒精併用可能會損害肝臟，應遵照醫囑或藥品仿單(說明書)使用，且服藥期間應避免飲用酒精性飲料。

感冒藥主要是症狀治療、緩解不適，不能殺死病毒也無法預防感冒，喝咖啡也不能增強免疫能力！感冒時要多休息、補充適量水份和電解質、少出入公共場所、出門戴口罩，如果感冒多天症狀加重，或持續發燒3天以上，就要立刻就醫！

2 貼盼坦尼止痛 避開熱源別剪破！

疼痛治療是一大學問！根據統計，國人的盼坦尼使用量逐年增加，其中以穿皮貼片的劑型最多。盼坦尼 (Fentanyl) 是一種強效類鴉片止痛劑，其止痛

效力比嗎啡高50至100倍，常用於手術麻醉、重度疼痛、慢性頑固性疼痛及癌症末期病患，在我國屬於第二級管制藥品，依據《管制藥品管理條例》規定，只能由食藥署製藥工廠負責其輸出、輸入、製造及販賣。

盼坦尼穿皮貼片中的藥物，會以穩定的速率從貼片中釋出，進入皮膚淺層累積並儲存，再被吸收進入全身血液循環系統，進而產生止痛作用。使用盼坦尼穿皮貼片時，應貼於腰部以上清潔乾燥的皮膚，最好是無毛髮生長的區域，不可以貼於傷口處，使用時需格外注意溫度，因為高溫會造成貼片中盼坦尼過量釋出，產生噁心、嘔吐、嗜睡等副作用，嚴重者甚至會抑制呼吸，因此使用盼坦尼穿皮貼片，一定要遠離熱源，包含發熱電毯、遠紅外線照燈、吹風機或泡澡等，以避免藥物於短時間內大量釋出。

盼坦尼穿皮貼片

- * 為醫師處方用藥
- * 應貼於腰部以上清潔乾燥的皮膚且無毛髮生長的區域為佳；不可以貼於傷口處
- * 使用時要遠離熱源
高溫會造成貼片中盼坦尼過量釋出
- * 不可剪開或破壞貼片後使用

此外，民眾使用盼坦尼穿皮貼片時，切勿任意更改劑量，也不可剪開或破壞貼片後使用，因為穿皮貼片的設計是讓藥物慢慢釋出，一旦遭破壞，也會使得



盼坦尼藥物短時間內大量釋放，造成不良生理反應。

食藥署提醒，盼坦尼穿皮貼片是醫師處方用藥，須由醫師依相關法規及使用指引處方開立，民眾使用時，應依照醫囑正確使用此類藥品；醫療人員及民眾懷疑因為使用本藥品導致不良反應發生時，請立即告知全國藥物不良反應通報中心，通報專線02-2396-0100，網站：<https://adr.fda.gov.tw>。

3 白白乳品學問多

您喜歡喝冰涼的鮮乳或常溫的保久乳嗎？由於各種乳製品的加工製程有所差異，保存條件也不一樣，萬一存放不當，很容易腐敗變質，食藥署特地為大家細說分明。

鮮乳、奶粉與保久乳來源都是生乳，不同的是殺菌方法。只有100%以生乳為原料，經過加熱殺菌，殺死大部分病原性細菌，必須冷藏保存的產品才能叫鮮乳。奶粉則是先高溫殺菌後，再透過噴霧乾燥等方式，讓液態的生乳變成乾燥粉狀。保久乳是以更高的溫度及時間進行商業滅菌，所以可在常溫下久放。其他乳含量只有50%以上，還添加調味料等，增加口味變化的「調味乳」和「乳飲品」，都不能稱為鮮乳，還需依規定在包裝明顯處加標「保久乳」、「調味

乳」、「乳飲品」等文字，以便消費者參考選購。

建議您在結帳前再拿取需冷藏的乳製品，縮短回溫變質時間，且返家後立刻放進冰箱冷藏存放。保久乳在未開封前，可常溫存放在陰涼乾淨的櫥櫃內，避免陽光直射或溫度太高的地方，以免影響品質。飲用乳品前最好先觀察乳品的狀況，確認沒有異味、變色或稠狀物等異樣，倒出後沒喝完的乳品，就不要再倒回原來的瓶子裡。

鮮奶、保久乳、奶粉的營養成分差異很小。選購乳製品時，要挑選包裝清潔完整、沒有破損滲漏的商品，包裝上除了有負責廠商、製造廠商的資料，也要有完整的營養標示，以及保存期限、保存條件等說明。對於不習慣喝冰冷鮮奶的長輩，可以選擇奶粉或保久乳飲用。



正.確.用.藥.好.簡.單.

藥品指示怎麼看？

非處方藥

指示藥與成藥 - 安全性高

成藥因安全性較高，
可以讓民眾自行選購；
指示藥則可經諮詢醫師藥師後使用



請遵循 3要2不！

但是.....

民眾仍常以錯誤的方式使用藥品

錯誤地使用
部分解熱鎮痛劑
導致肝損傷



錯誤地使用
制酸劑
而影響腸胃道
營養吸收



錯誤地使用
特定消炎止痛藥
導致腎損傷或腸胃出血



綜合感冒藥
常含有嗜睡成分
若未注意而去開車
或操作危險器械
容易造成意外



要知風險

所有藥品都有風險

要問藥師

購買藥品時與藥師討論使用方式

要看標示

使用前看清楚外盒及說明書的指示

不過量

依照說明書的使用方式

不輕忽

3天以上症狀未改善，需盡速就醫

正確用藥好簡單，還要看懂外盒標示&說明書!!

閱讀外盒可以快速辨識藥品之用途，
並且確認誰不能吃、怎麼吃等資訊！

閱讀仿單可以快速了解注意事項，
針對服藥前及服藥後，皆有實用的說明！

藥物資訊與注意事項	有效成分
	用途
	使用族群
	用法用量
	類別
	諮詢專線
	QR Code



品名
廠商
批號
製造日期
有效日期

廠商產品基本資訊

TFDA食品藥物管理署 監製

藥物食品安全週報



成分

用途(適應症)

使用上注意事項

用法用量

警語

包裝

藥前藥後都要看喔!!



刊 名：藥物食品安全週報

出版機關：衛生福利部食品藥物管理署

地 址：臺北市南港區昆陽街161-2號

電 話：02-2787-8000

GPN : 4909405233

ISSN : 1817-3691

編輯委員：陳信誠、許朝凱、江仟琦、李婉媧、蔡佳芬、黃守潔、黃秋羽、楊博文、簡希文
洪志平、吳正寧、林邦德、羅維新、周清邦、楊雅珺、林高賢、陳信志

美術編輯：郭儀君

出版年月：2019年12月13日

創刊年月：2005年9月28日

第743期第 4 頁

刊期頻率：每週一次